

○ 医師が記入した証明書が必要な感染症

江東区医師会監修（平成25年1月）

感染症名	感染しやすい期間	登園のめやす
麻疹（はしか）	感染後7日目～発疹出現後の5日目まで	解熱後3日を経過してから
インフルエンザ	潜伏期～解熱後2日 （発症前24時間～発症後3日程度まで が最も感染力が強い）	発症後5日以上を経過し、なおかつ解熱後3日以上を経過してから
風疹	発疹出現前7日～出現後5日目	皮疹が消失してから
水痘 （みずぼうそう）	発疹出現1日前～痂皮形成まで	すべての皮疹が痂皮化してから
帯状疱疹	水疱を形成している間 （水痘に対して免疫のない子どもが 接触すると水痘を発症する）	すべての皮疹が痂皮化してから
流行性耳下腺炎 （おたふくかぜ）	耳下腺腫脹1日前～腫脹消退3日後	耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が始まった後5日を経過し、かつ全身状態が良好となってから
咽頭結膜熱 （プール熱）	発熱、結膜充血等症状が出現した数日間	主な症状がすべて消えた後、2日を経過してから
流行性角結膜炎 （はやり目）	充血、目やに等症状が出現した数日間	結膜炎の症状が消失してから （感染力が非常に強い為必ず医師の診察を経ること）
百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出現後 3週間を経過するまで 抗菌薬を使用後、2週間まで	適切な抗菌薬を開始後5日以上を経過してから、 あるいは特有の咳が消失し、全身状態が良好であること （抗菌薬を決められた期間服用する。通常2週間）
結核	—	感染のおそれなくなってから
腸管出血性 大腸菌感染症	便中に菌を排出している間	症状が軽快し、便培養により菌陰性が確認されてから （必ず医師の診察を経ること）

砂町保育園

登園のめやすは、食事も含め子どもの全身状態が良好であることが基準となります。

意見書

砂町保育園園長 殿

園児氏名：

生年月日： 平成・令和 年 月 日生

病名（疾患に○印）

インフルエンザ・麻疹（はしか）・風疹・水痘（みずぼうそう）

帯状疱疹・流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）・咽頭結膜熱（プール熱）

流行性角結膜炎（はやり目）・百日咳・腸管出血性大腸菌感染症・結核

（その他： ）

上記児童は令和 年 月 日から症状も回復し、集団生活に支障がない状態になったので登園可能と判断します。

令和 年 月 日

医療機関名：

医師氏名：

印